

Repinaldo

Número de identificación en la colección: 106

Procedencia: Carballo (A Coruña)

Latitud: 43° 13'

Longitud: 5° 01'

Altitud: 106 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 13 abril

Floración (F2): 5 mayo

Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: media

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: biondulado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: no presenta

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta