

Tardías

Número de identificación en la colección: 115

Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)

Latitud: 43° 24'

Longitud: 8° 10'

Altitud: 30 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 18 abril

Floración (F2): 8 mayo

Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globosa

Tamaño: grande

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha

Color de la pulpa: blanca-amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: Crocante

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: ataque débil

Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: no presenta

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta