

Temprana Blanca

Número de identificación en la colección: 125

Procedencia: Senra (A Coruña)

Latitud: 43° 40'

Longitud: 7° 51'

Altitud: 361 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 15 abril

Floración (F2): 3 mayo

Recolección (K): 4 agosto

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: elíptico-cónica

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, en contacto en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: seca

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: no presenta

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta