

Desconocida

Número de identificación en la colección: 188

Procedencia: Sta.M^a.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Mesa

FENOLOGIA

Brotación (C3): 12 abril

Floración (F2): 27 abril

Recolección (K): 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: variable, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: suave

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: no ácidas y dulces

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: cordiforme

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: ataque débil