

Louriñán

Número de identificación en la colección: 250

Procedencia: Insua (Pontevedra)

Latitud: 42° 23'

Longitud: 8° 30'

Altitud: 200 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 13 abril

Floración (F2): 20 mayo

Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y ancha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: biondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: cordiforme

Presencia de substípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: ataque medio

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: ataque medio

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta