

Xaneira

Número de identificación en la colección: 251

Procedencia: Insua (Pontevedra)

Latitud: 42° 23'

Longitud: 8° 30'

Altitud: 200 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 5 abril

Floración (F2): 25 abril

Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: oblongo-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: grandes

Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: firme

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: ataque medio

Momificado: ataque débil

Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta