

Repinaldo

Número de identificación en la colección: 253

Procedencia: Insua (Pontevedra)

Latitud: 42° 23'

Longitud: 8° 30'

Altitud: 200 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 6 abril

Floración (F2): 27 abril

Recolección (K): 26 agosto

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: elíptico-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: erectos, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta