

Toca Pandeiro

Número de identificación en la colección: 256

Procedencia: Meaño (Pontevedra)

Latitud: 42° 26'

Longitud: 8° 46'

Altitud: 82 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 3 abril

Floración (F2): 29 abril

Recolección (K): 2 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: oblongo-cónica

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: acidez alta

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: ataque débil

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta