

Roja de Verano

Número de identificación en la colección: 257

Procedencia: Castrelo (Pontevedra)

Latitud: 42° 28'

Longitud: 5° 07'

Altitud: 20 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 6 abril

Floración (F2): 2 mayo

Recolección (K): 29 julio

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad fuerte

Forma: globoso-cónica

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y media

Color de la pulpa: blanca-crema

Firmeza de la pulpa: suave

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez alta

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: biondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: ataque débil