

Camoesa

Número de identificación en la colección: 264

Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)

Latitud: 42° 17'

Longitud: 8° 36'

Altitud: m.

Destino: Mesa

FENOLOGIA

Brotación (C3): 9 abril

Floración (F2): 10 mayo

Recolección (K): 12 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: grande

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: erectos, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y corto

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha

Color de la pulpa: blanca-crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez baja y dulces

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: ataque débil