

## De San Juan

**Número de identificación en la colección:** 265

**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)

**Latitud:** 42° 17'

**Longitud:** 8° 36'

**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 9 abril

**Floración (F2):** 28 abril

**Recolección (K):** 30 julio

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** bicolor

**Chapa:** lavada, intensidad media

**Forma:** plana

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** pequeñas

**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** Crocante

**Jugosidad:** jugosa

**Sabor:** media

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** larga

**Máxima anchura del limbo:** ancha

**Longitud de las estípulas:** corta

**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido

**Denticulación del borde del limbo:** ondulado

**Forma del ápice del limbo:** mucronado

**Forma de la base del limbo:** agudo

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** larga

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** larga

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque medio

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** ataque débil

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanífero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta