

Desconocida

Número de identificación en la colección: 267

Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)

Latitud: 42° 17'

Longitud: 8° 36'

Altitud: m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 19 abril

Floración (F2): 6 mayo

Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: ataque medio

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta