

## Parecida a Cox

**Número de identificación en la colección:** 281

**Procedencia:** Lourizán (Pontevedra)

**Latitud:** 42° 25'

**Longitud:** 8° 38'

**Altitud:** 20 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 11 abril

**Floración (F2):** 6 mayo

**Recolección (K):** 21 septiembre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** bicolor

**Chapa:** a rayas, intensidad media

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** medio

**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

**Sensibilidad al russetting:** poco sensible

**Tamaño lenticelas:** pequeñas

**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** débil

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** corta

**Máxima anchura del limbo:** estrecha

**Longitud de las estípulas:** corta

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** cuspidado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** desconocido

**Anchura de los pétalos:** desconocido

**Disposición de los pétalos:** desconocido

**Longitud del pedúnculo:** desconocido

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque débil

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** ataque débil

**Momificado:** ataque débil

**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta