

## Peros Blancos

**Número de identificación en la colección:** 360

**Procedencia:** Magazos (Lugo)

**Latitud:** 43° 39'

**Longitud:** 7° 35'

**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 27 abril

**Floración (F2):** 10 mayo

**Recolección (K):** 22 octubre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** sin chapa

**Forma:** globosa

**Tamaño:** medio

**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** pequeñas

**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** firme

**Textura de la pulpa:** Crocante

**Jugosidad:** jugosa

**Sabor:** acidez media y dulzor bajo

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** larga

**Máxima anchura del limbo:** ancha

**Longitud de las estípulas:** media

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** acuminado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** media

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** libres entre sí

**Longitud del pedúnculo:** larga

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque débil

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** ataque débil

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta