

## Blanca Cerosa

**Número de identificación en la colección:** 69

**Procedencia:** Doroña (A Coruña)

**Latitud:** 43° 21'

**Longitud:** 8° 07'

**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 19 abril

**Floración (F2):** 10 mayo

**Recolección (K):** 17 septiembre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** bicolor

**Chapa:** a manchas, intensidad media

**Forma:** globoso-cónica

**Tamaño:** medio

**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** pequeñas

**Disposición de los sépalos:** erectos, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** jugosa

**Sabor:** no ácida y dulzor medio

**Aroma:** aromática

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** media

**Máxima anchura del limbo:** media

**Longitud de las estípulas:** media

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** acuminado

**Forma de la base del limbo:** agudo

**Presencia de subestípulas:** presentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** larga

**Anchura de los pétalos:** ancha

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque débil

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** ataque débil

**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** ataque débil

**Chancro:** no presenta