

## Reinetas

**Número de identificación en la colección:** 94

**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)

**Latitud:** 43° 24'

**Longitud:** 8° 10'

**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 21 abril

**Floración (F2):** 7 mayo

**Recolección (K):** 17 septiembre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** bicolor

**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte

**Forma:** globosa

**Tamaño:** medio

**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** jugosa

**Sabor:** media

**Aroma:** aromática

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** media

**Máxima anchura del limbo:** ancha

**Longitud de las estípulas:** corta

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** biondulado

**Forma del ápice del limbo:** acuminado

**Forma de la base del limbo:** cordiforme

**Presencia de subestípulas:** presentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** media

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** corta

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque débil

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanífero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta