

Repinaldo

Número de identificación en la colección: 95

Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)

Latitud: 43° 24'

Longitud: 8° 10'

Altitud: 30 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 16 abril

Floración (F2): 8 mayo

Recolección (K): 14 agosto

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: erectos, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: suave

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: seca

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: desconocido

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta