

Temprana

Número de identificación en la colección: 97

Procedencia: Laiño (A Coruña)

Latitud: 42° 42'

Longitud: 8° 42'

Altitud: 60 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 6 abril

Floración (F2): 29 abril

Recolección (K): 29 julio

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque fuerte

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta