

## Verdosa Temprana

**Número de identificación en la colección:** 99

**Procedencia:** Pobra de Brollon (Lugo)

**Latitud:** 42° 33'

**Longitud:** 7° 23'

**Altitud:** 399 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 9 abril

**Floración (F2):** 24 abril

**Recolección (K):** 15 septiembre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** bicolor

**Chapa:** a rayas, intensidad media

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** medio

**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula

**Sensibilidad al russetting:** sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media

**Color de la pulpa:** crema

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** débil

**Aroma:** aromática

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** media

**Máxima anchura del limbo:** media

**Longitud de las estípulas:** larga

**Máxima anchura de las estípulas:** ancha

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** mucronado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** presentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** larga

**Anchura de los pétalos:** ancha

**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque medio

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta